

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Sabendo que a organização e a gestão dos processos de trabalho em saúde, em especial do trabalho de uma equipe na atenção básica, constituem um dos eixos centrais da reordenação da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde, julgue os itens a seguir.

- 51 Os critérios e parâmetros para a realização de determinado processo de trabalho são estabelecidos de acordo com a finalidade desse processo de trabalho.
- 52 Em um processo de trabalho, os objetivos são projeções de resultados destinadas a satisfazer necessidades e expectativas dos seres humanos, conforme sua organização social.
- 53 Para garantir maior participação social, os processos de trabalho, individuais ou em equipe, devem-se realizar fora de organizações sociais ou instituições especialmente constituídas para determinado fim.

No que se refere ao sistema digestório, julgue os próximos itens.

- 54 É no estômago que a bile, enzima que emulsifica as moléculas de gordura, possibilitando a ação da lipase, atua no bolo alimentar.
- 55 No duodeno, o quimo, massa muscular ácida, é neutralizado pelo bicarbonato de sódio liberado pela mucosa intestinal em decorrência da ação da secretina.

Julgue os itens seguintes, relativos às hemácias.

- 56 As células que se formam nas medulas vermelhas dos ossos longos contêm os aglutinógenos, classificados em A e B, cuja presença define o tipo sanguíneo.
- 57 A parte sólida do sangue é composta majoritariamente pelas hemácias, células que apresentam núcleo e hemoglobina, pigmento rico em ferro e responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.

A um paciente com tumor cerebral não sensível aos benzodiazepínicos, que apresentava crises convulsivas generalizadas, de longa duração e que se repetiam a pequenos intervalos, o médico prescreveu cinco ampolas de fenitoína em 250 mL de solução fisiológica a 0,9%, para ser infundidas a 100 mL/h. Na unidade de saúde onde o paciente se encontrava, havia apenas ampolas de fenitoína de 5 mL a 5%.

Com base nas informações apresentadas acima, julgue os itens que se seguem.

- 58 Para atender à prescrição, a medicação deve ser administrada a um gotejamento de aproximadamente 33 gotas/min.
- 59 Para atender à prescrição, deve ser administrado 1g da medicação disponível, em um total de 25 mL.

No que se refere aos agentes infecciosos e ectoparasitas e às doenças por eles transmitidas, julgue os itens subsequentes.

- 60 As bactérias, seres unicelulares de formas diversas, estão presentes na flora normal humana. A sua presença desempenha importante papel na defesa do organismo, por competição.
- 61 Os vírus, formados apenas por material genético (DNA ou RNA) e uma membrana proteica e incapazes de se reproduzir fora de uma célula, podem causar doenças no homem, animais e plantas.

A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir na qualidade de vida, na saúde humana e no meio ambiente. Acerca desse assunto, julgue os próximos itens.

- 62 A flora bacteriana transitória presente nas mãos, composta por microrganismos frequentemente responsáveis pelas infecções hospitalares, é eliminada com água e sabão neutro.
- 63 Dada a volatilidade do hipoclorito de sódio, composto clorado de uso comum, a solução que o contenha em sua fórmula deve ser trocada a cada doze horas, sendo recomendado, para desinfecção de alto nível, o uso de solução a 1% de concentração, por dez minutos.

No que concerne à infecção hospitalar, jugue os itens a seguir.

- 64 A desinfecção de alto nível, indicada para a desinfecção de itens semicríticos, inclui a eliminação de alguns poros, do bacilo da tuberculose, de todas as bactérias vegetativas e de todos os vírus.
- 65 O uso de glutaraldeído e hipoclorito de sódio é eficiente para a descontaminação, pois reduz o número de microrganismos presentes nos artigos sujos.

RASCUNHO

Julgue os itens seguintes, relativos à administração de medicação por nebulização/inalação e à oferta de oxigênio.

- 66 Para prevenir a irritação das narinas causada pelo cateter nasal, que leva o oxigênio para dentro da orofaringe, deve-se alternar o seu uso entre uma narina e outra a cada duas horas.
- 67 A nebulização tem como finalidade fluidificar secreção da mucosa do trato respiratório, facilitando sua expulsão. Durante a realização da nebulização, deve-se manter o paciente em posição de Fowler e, terminado o procedimento, deve-se estimular a tosse. A nebulização é contraindicada para pacientes com queimadura no rosto.

Os indicadores de saúde coletiva, entre outros aspectos, são relevantes para o planejamento de ações de prevenção e controle de doenças e agravos. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 68 Epidemia refere-se ao aumento de casos de determinada doença, em índice muito acima do esperado, em uma região delimitada.
- 69 Em se tratando do indicador morbidade, que se refere ao comportamento das doenças em uma população exposta ao adoecimento, define-se surto como o aumento repentino do número de casos de determinada doença dentro de determinado limite territorial. No Brasil, um único caso de poliomielite seria suficiente para configurar um surto.

No que se refere à assistência em saúde mental, julgue o item abaixo.

- 70 O paciente com depressão, um distúrbio de humor que pode ser mascarado por ansiedade e queixas somáticas, nunca deve ficar sozinho, dado o risco de suicídio associado a sua condição.

Acerca dos cuidados gerais de enfermagem na assistência pós-operatória imediata na sala de recuperação, julgue os itens subsequentes.

- 71 Após avaliação inicial da função respiratória e cardiovascular, da coloração cutânea, do nível de consciência e da capacidade de responder a comandos, deve-se monitorar os sinais vitais e o estado físico do paciente, registrando-se os dados a cada trinta minutos.
- 72 Durante a transferência do paciente da sala de operação para a sala de recuperação, de responsabilidade do anestesista, deve-se dar especial atenção à incisão cirúrgica e a eventuais alterações vasculares, movimentando-se o paciente lentamente para evitar hipertensão ortostática.

A respeito da assistência a pacientes com disfunções endócrinas associadas à glicose, julgue os itens seguintes.

- 73 As insulinas regular e NPH podem ser administradas por via endovenosa ou subcutânea.
- 74 A cetoacidose diabética, complicação aguda do diabetes melito, caracteriza-se por hiperglicemia, cetonúria, acidose e desidratação. As manifestações clínicas tardias da cetoacidose diabética são hálito adocicado e respiração de Kussnaul.
- 75 A insulina, hormônio secretado pelo pâncreas, é essencial para a utilização da glicose no metabolismo celular, estando associada ao correto metabolismo da proteína e do lipídio.

Acerca da hipertensão arterial, julgue os itens que se seguem.

- 76 A restrição de ingestão de sal constitui uma das medidas não farmacológicas para controle da pressão arterial, porém a atividade física é contraindicada devido ao risco de aumento dos níveis pressóricos.
- 77 A monitoração ambulatorial da pressão arterial (MAPA) permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial por um período de vinte e quatro horas.

No que concerne à assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva (UTI), julgue os itens subsequentes.

- 78 Deve ser evitada a contenção física nos pacientes com delírio em UTI.
- 79 Cuidados com o tubo traqueal, o dreno, a traqueostomia, a nebulização, a aspiração traqueal e a dieta enteral são atribuições rotineiras do técnico de enfermagem em UTI.
- 80 As arritmias cardíacas raramente são eventos isolados em UTI, estando associadas a patologias como infarto agudo do miocárdio, doença cardíaca congênita ou valvular, cardiomiopatias, doenças pulmonares, intoxicação por drogas ou alterações eletrolíticas.

Julgue os itens a seguir quanto à assistência de enfermagem em emergência.

- 81 Os prontos-socorros são considerados suficientes para atender a demanda gerada em uma situação de desastre, haja vista que dispõem de grande quantidade de recursos para o atendimento de emergência.
- 82 Indivíduos com hemorragias apresentam sinais e sintomas como pele pálida, úmida e viscosa, hipotermia, pulso lento, sede, respiração lenta e profunda, tonturas e desmaios, além de pressão arterial alta.
- 83 Procedimentos como toracotomia, pequena cirurgia, traqueostomia, dissecação venosa, punção de subclávia, punção lombar e drenagem torácica demandam a presença do técnico de enfermagem no pronto-socorro.
- 84 No pronto-socorro, a primeira etapa de atendimento do paciente é a triagem, cujo objetivo é o de determinar o melhor encaminhamento para cada caso.

A respeito da assistência de enfermagem em situação de trauma, julgue os próximos itens.

- 85 Em regiões metropolitanas, o armamento bélico utilizado por criminosos pode originar casos emergenciais que demandem do profissional de enfermagem preparação para atender pessoas vítimas de explosões de dinamites, granadas e minas.
- 86 No atendimento inicial ao paciente traumatizado, o quadro neurológico deve ser avaliado por meio da observação do nível hemorrágico, da manutenção da respiração e das respostas normais a estímulos táteis.
- 87 Dado que o traumatismo raquimedular compromete a inervação do corpo abaixo do nível de sua localização, no caso de lesão cervical alta, o comprometimento motor poderá levar à parada respiratória em decorrência de paralisia dos músculos responsáveis por essa função.
- 88 Ferimentos por arma de fogo são considerados estéreis, em razão da penetração do projétil com grande velocidade e calor.
- 89 Se o paciente estiver inconsciente e apresentar dificuldade para respirar ou períodos de apneia, o enfermeiro deverá utilizar um tubo endotraqueal para estabilizá-lo.
- 90 No choque hipovolêmico provocado por hemorragia, deve-se realizar a imediata reposição de líquidos por meio de punção de acesso venoso, seguida de coleta de amostra de sangue para verificar tipagem, hematócrito e hemoglobina e para realizar teste de compatibilidade sanguínea.

No que se refere a doenças de interesse para a saúde pública, especialmente as transmissíveis causadas por bactérias, julgue os seguintes itens.

- 91 Doença infecciosa intestinal aguda, a cólera é causada pela enterotoxina produzida pelo *Vibrio cholerae* e apresenta como sintomas, na sua forma grave, diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, com depleção hídrica e eletrolítica, dor abdominal e câibras.
- 92 Em caso de suspeita de tétano, devem ser considerados os seguintes sintomas apresentados pelos pacientes: dificuldade para deglutir, diarreia, contraturas musculares, localizadas ou generalizadas, e ascite.
- 93 A febre tifoide apresenta as características de sazonalidade e de distribuição geográfica definida.
- 94 A tuberculose apresenta-se nas formas pulmonar e extrapulmonar e em diversos tipos: pleural, ganglionar, osteoarticular, entérica, de vias urinárias, cutânea e ameningea, que é considerada a forma mais grave, haja vista que atinge o sistema nervoso central.
- 95 A hanseníase ou mal de Hansen é causada pelo *Mycobacterium leprae* e afeta os nervos, o sistema digestório e a pele.

Acerca de doenças infectoparasitárias e sua forma de transmissão, julgue os itens subsequentes.

- 96 Na esquistossomose mansônica, a transmissão da doença depende da existência de hospedeiros intermediários.
- 97 A dengue tem como agente etiológico o mosquito do gênero *Aedes*, e a espécie *Aedes aegypti* é a mais importante no processo de transmissão da doença.
- 98 A transmissão da raiva ocorre pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e mais raramente pela arranhadura e lambedura de mucosas.
- 99 No Brasil, a forma de transmissão da leishmaniose visceral ocorre durante banhos de rios e açudes que tenham caramujos infectados.
- 100 A transmissão natural da doença de Chagas é vetorial e ocorre por meio das fezes dos triatomíneos, vulgarmente conhecidos por barbeiros, entre outros nomes.

Julgue os itens seguintes, relativos à rede de atenção à saúde.

- 101 A governança solidária nas regiões de saúde implica o compartilhamento de estruturas administrativas, de recursos, de sistema logístico e apoio, além de um processo contínuo de monitoramento e avaliação da rede de atenção à saúde.
- 102 Na rede de atenção às condições crônicas, a atenção primária à saúde funciona como centro de comunicação, mas, na rede de atenção às urgências e emergências, ela é um dos pontos de atenção, não desempenhando o papel de coordenação dos fluxos e contrafluxos dessa rede.
- 103 Observa-se, no Brasil, a necessidade de ampliação da atenção para o manejo das condições agudas, dado o atual perfil epidemiológico país, caracterizado por uma tripla carga de doença que envolve a persistência de doenças parasitárias, infecciosas e desnutrição; problemas de saúde reprodutiva, com mortes maternas e óbitos infantis por causas consideradas evitáveis; e o crescimento das mortes por causas externas em decorrência do aumento da violência e dos acidentes de trânsito.
- 104 Com a implantação da rede de atenção à saúde, a denominada lista de espera foi extinta no sistema de saúde, com o fim de acelerar o atendimento e humanizar a assistência.
- 105 A atenção primária à saúde desempenha um papel preponderante na estruturação da rede de atenção à saúde, pois se refere aos cuidados longitudinais, normalmente são ofertados de forma fragmentada pelo sistema de saúde convencional.

Acerca da estratégia Saúde da Família (ESF), do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e das unidades básicas de saúde (UBS), julgue os itens subsequentes.

- 106 As unidades hospitalares e maternidades não participam diretamente na implementação dos programas de suplementação de micronutrientes, devendo as puérperas procurar as UBS se necessitarem de suplementação de vitamina A.
- 107 São da responsabilidade da esfera municipal de governo o estímulo e o apoio para a adoção da estratégia Saúde da Família (ESF) como tática prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica à saúde.
- 108 Em grandes centros urbanos, recomenda-se o uma UBS, se a unidade contemplar a Saúde da Família, para, no máximo, 12 mil habitantes, localizada dentro do território determinado, de modo a garantir os princípios e as diretrizes da atenção básica.
- 109 É atribuição específica do enfermeiro a realização do cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde e, se necessário, no domicílio e em espaços comunitários como escolas e associações.
- 110 É permitido ao agente comunitário de saúde desenvolver atividades na UBS.

Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH), implementada pelo Ministério da Saúde, julgue os itens a seguir.

- 111 A PNH não prevê a garantia de referência e contrarreferência, embora preveja explicitamente o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura dos usuários.
- 112 Com a humanização da saúde, busca-se, entre outros objetivos, valorizar diretamente o trabalho e o trabalhador.
- 113 Entre os princípios norteadores da PNH inclui-se o fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com base na legislação relativa à enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 114 Cabe privativamente ao enfermeiro registrar, no prontuário do paciente, o resumo dos dados coletados, em dado momento do processo saúde e doença, referentes ao paciente, a sua família ou à coletividade humana.
- 115 É proibido ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
- 116 A aplicação da pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem.
- 117 São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa e as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
- 118 Ainda que não seja prevista, no Código de Ética de Enfermagem, punição para o ato de anunciar prestação de serviços gratuitos ou para a proposição de honorários que caracterizem concorrência desleal, essas condutas constituem falta moral.
- 119 O técnico de enfermagem exerce, em grau de auxiliar, atividade de orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem, participando de todas as etapas do processo de enfermagem, incluindo-se a de diagnóstico.

Acerca do primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e do prazo para o início do seu tratamento no SUS, julgue o item abaixo.

- 120 Somente será considerado efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna a partir da primeira sessão de radioterapia ou de quimioterapia.